

України видову насиченість. В одному описі з середньою площею близько 900 кв.м виявляється в середньому 48 видів судинних рослин. Для порівняння ця величина в угрупованнях союзу Carpinion Журавлівської дачі (Вінницька область) – 41, Медоборів – 38, околиць м.Умань – 33, Кременецьких гір – 32, м.Києва – 30, Чорного лісу (Кіровоградська область) – 29, Цуманського лісу (Волинська область) – 28, Вулканічних Карпат біля Мукачеве – 26, Закарпатської низовини біля Мукачеве – 25.

Для ас. *Isopyro thalictroidis-Carpinetum* раніше було виділено три субасоціації (одна з них – провізорно) [4]. На матеріалі з Панівецької дачі можна виділити дві з цих субасоціацій – *Isopyro thalictroidis-Carpinetum caricetosum pilosae* Onyshchenko 1998 та *Isopyro thalictroidis-Carpinetum corydaletosum cavae* Onyshchenko 1998. Крім того, два описи з Панівецької дачі є достатньо своєрідними, щоб провізорно виділити ще одну субасоціацію – *Isopyro thalictroidis-Carpinetum melicetosum pictae subass. nova prov.* Найпоширенішою в Панівецькій дачі є субасоціація *Isopyro thalictroidis-Carpinetum caricetosum pilosae* (диференційні види – *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Lathyrus vernus*, *Viola mirabilis*). Дещо меншу площу займає субасоціація *Isopyro thalictroidis-Carpinetum corydaletosum cavae* (диференційні види – *Corydalis cava*, *Ficaria verna*, *Geranium phaeum*, *Sambucus nigra*, *Urtica dioica*). Ця субасоціація пов'язана переважно із зниженими місцями і схилами північної експозиції. До субас. *Isopyro thalictroidis-Carpinetum melicetosum pictae* належить 2 описи, зроблені на схилі південної експозиції в долині маленької річки, яка перетинає ліс із заходу на схід в північній його частині. Диференційні види – *Carex brevicollis*, *Brachypodium sylvatica*, *Bromopsis benekenii*, *Carex muricata*, *Cornus mas*, *Cruciata glabra*, *Lathyrus niger*, *Melica picta*, *Poa nemoralis*, *Pyrethrum corymbosum*, *Scutellaria altissima*. Диференційні види, спільні з субас. *Isopyro thalictroidis-Carpinetum caricetosum pilosae* – *Campanula rapunculoides*, *Carex pilosa*, *Viola mirabilis*. Характерним для цієї субасоціації є високе проективне покриття *Convallaria majalis*.

В наведених описах є 3 види з Червоної книги України – *Cephalanthera damasonium* (в одному описі), *Epipactis helleborine*

(в одному описі) *Lilium martagon* (в двох описах). Поза описами у заказнику відмечено ще 6 видів, занесених до Червоної книги України – *Epipactis purpurata*, *Listera ovata*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera bifolia*, *Platanthera chlorantha*, *Scopolia carniolica*.

Список літератури:

1. Геоботаничне районування Української РСР. – Київ: Наук. думка, 1977. – 304 с.
2. Онищенко В.А., Лукаш О.В. Лісова рослинність ур. Журавлівська дача (Тульчинський район Вінницької області) // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – 223, № 1. – С. 222-230.
3. Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Парфенов В.И., Чопик В.И. и др. – Киев: Наук. думка, 1980. – 392 с.
4. Onyschenko V.A. Wood Plants Communities (Fagetalia Pawl.1928) of the Medobory Reserve // Ukr. Phytosoc. Coll. ser. A, №1 (9). – 1998. – P. 97-115.

Onyshchenko V.A., Lubinska L.G.

OAK-HORNBEAM FORESTS OF THE PANIVETSKA DACHA (KHMELNYTSKA OBLAST)

The Panivetska dacha is situated near town Kamyanets-Podilsky (Khmelnyska oblast). It is a state botanical zakaznik (reserve). 14 phytosociological releves are presented. All releves belong to ass. *Isopyro thalictroidis-Carpinetum* (all. Carpinion). 3 subassociations are distinguished. One of them is a new provisional syntaxon. 9 species from the Red Data Book found in the forest are listed.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Герещенківська, 2, Київ, 01601

Кам'янець-Подільський державний університет 32300
Кам'янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61

Одержано редколегією 11.07.2005 р.